

FRONTLINE TRI-ACT® solución spot-on para perros 2-5 kg (0,5 ml), 5-10 kg (1 ml), 10-20 kg (2 ml), 20-40 kg (4 ml) y 40-60 kg (6 ml). **Composición:** Cada ml contiene: Fipronilo 67,6 mg; Permetrina 504,8 mg. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando sea necesario una actividad repelente (anti-alimentación) contra flebotomos, moscas picadoras y/o mosquitos. Repele y mata flebotomos y reduce su riesgo de infección de *Leishmania infantum*. Repele (actividad anti-alimentación) y mata la mosca de los establos. **Contraindicaciones:** No usar en animales enfermos o convalecientes. No usar en gatos ni en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. No usar en caso de hipersensibilidad a los principios activos o a algún excipiente. **Gestación y lactancia:** Los estudios de laboratorio efectuados con fipronilo o permetrina no han producido ninguna evidencia de efectos teratogénicos o embriotóxicos. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación, la lactancia ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Reacciones adversas:** Reacciones cutáneas transitorias en la zona de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, enrojecimiento), picor generalizado, pérdida de pelo y eritema se han observado en raras ocasiones. Signos nerviosos reversibles (hiperactividad, hiperestesia, temblor muscular, depresión, ataxia, otros signos nerviosos), vómito, anorexia e hipersalivación también se han reportado en raras ocasiones. En caso de lamido de la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria y emesis. **Posología:** Para uso externo. La dosis mínima recomendada es de 6,76 mg de fipronilo/kg de peso corporal, y 50,48 mg de permetrina/kg de peso corporal, equivalente a 1 ml de solución spot-on por kg de peso corporal. Seleccionar el tamaño de pipeta apropiado para el peso del perro. El medicamento debería ser aplicado en dos puntos fuera del alcance del animal de manera que éste no pueda lamerlas. **Precauciones:** No recomendado en perros menores de 8 semanas de edad ni de menos de 2 kg de peso. Evitar el contacto con los ojos del perro. Es importante asegurarse de que se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que otros animales no lamen la zona de aplicación después del tratamiento. **Conservación:** Conservar en el blíster original. No conservar a temperatura superior a 25 °C. **Nº autorización:** 3089 - 3093 ESP. **Presentación:** 3 o 6 pipetas en blísteres. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria. En caso de duda consulte a su veterinario.**