

Frontline® Combo Spot-on Perro. Composición: Cada ml contiene: Fipronilo 100,00 mg; (S)-metopreno 90,00 mg. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. **Contraindicaciones:** No utilizar en cachorros de menos de 8 semanas de edad. No usar en animales enfermos (ej. enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. **Reacciones adversas:** Entre las reacciones adversas muy raras se han comunicado: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o pérdida de pelo. También se ha podido observar salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilidad a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios. **Posología:** Aplicación tópica sobre la piel. La dosis mínima recomendada de 6,7 mg/kg de fipronilo y 6 mg/kg de (S)-metopreno. El intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. **Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos del animal. Asegurarse de que el medicamento se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento. Deben evitarse baños o inmersión en agua durante los 2 días siguientes a la aplicación del producto así como baños más frecuentes que una vez por semana. **Formatos:** 1, 3 y 6 pipetas en blisters. **Nº autorización:** 1534-1537 ESP. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.