

**Frontline® Spot-on Gato. Composición:** Cada ml contiene: Fipronilo 100,00 mg. **Especies de destino:** Gato. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas. Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador. **Contraindicaciones:** No utilizar en gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg ni en hurones de menos de 6 meses de edad. No usar en animales enfermos (ej. enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No usar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. **Reacciones adversas:** De forma esporádica se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la utilización del producto: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (escamas, alopecia local, prurito, eritema) así como prurito general o alopecia. En muy raras ocasiones, tras la administración del medicamento, se ha podido observar hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (letargia, ataxia, temblor muscular, convulsión, hiperestesia y otros síntomas nerviosos) y vómitos. **Posología:** Vía de administración externa, mediante aplicación sobre la piel. Una pipeta (0,5 ml) por gato. El intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. **Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos del animal. Asegurarse de que el medicamento se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento. No se recomienda bañar a los animales dentro de los dos días después de la aplicación del medicamento. **Formatos:** 3 y 6 pipetas de 0,5 ml en blisters. **Nº autorización:** 1163 ESP. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.