

Frontline® Spot-on Perro. Composición: Cada ml contiene: Fipronilo 100,00 mg; (S)-metopreno 90,00 mg. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas. Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador. **Contraindicaciones:** No utilizar en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o peso inferior a 2 kg. No utilizar en animales enfermos (ej. enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. **Reacciones adversas:** De forma esporádica se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la utilización del producto: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (escamas, alopecia local, prurito, eritema) así como prurito general o alopecia. Excepcionalmente, tras la administración del medicamento, se ha podido observar hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios. **Posología:** Vía de administración externa, mediante aplicación sobre la piel. 1 pipeta de 0,67 ml por perro que no supere los 10 kg de peso corporal. 1 pipeta de 1,34 ml por perro, de peso comprendido entre 10 y 20 kg de peso corporal. 1 pipeta de 2,68 ml por perro, de peso comprendido entre 20 y 40 kg de peso corporal. 1 pipeta de 4,02 ml por perro, de peso superior a 40 kg. El intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. **Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos del animal. Asegurarse de que el medicamento se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento. Deben evitarse baños o inmersión en agua durante los 2 días siguientes a la aplicación del producto así como baños más frecuentes que una vez por semana. **Formatos:** 3, 6 y 18 pipetas en blisters. **Nº autorización:** 1230 ESP. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.